

# ゲルタイプの速乾性すり込み式手指消毒剤

速乾性すり込み式手指消毒剤

# イアプラス<sup>®</sup>ゲルA

ETHAPLUS<sup>®</sup> GEL



手荒れ、使用感に配慮した  
ゲルタイプの手指消毒剤です。



## ■ 特性

1. 広い抗微生物スペクトル、迅速な殺菌効果を示します。
2. ゲルタイプなので、液の飛散やこぼれ落ちがありません。
3. 手荒れ防止に配慮した処方、保湿剤としてヒアルロン酸ナトリウム、グリセリンを配合しています。
4. べたつきやヨレが少ない良好な使用感です。
5. 500mLは減容ボトル採用によりゴミが削減できます。また、手押し式ポンプ付で各種ディスペンサーに装着可能です。
6. 60mLは携帯しやすいハンディータイプで、ワンタッチキャップ式です。

## ■ 成分

エタノール (C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O) 76.9 ~ 81.4 vol%  
 添加物：ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸、エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

## ■ 効能効果、用法用量

- 効能効果  
手指・皮膚の洗浄・消毒
- 用法用量  
適量を手指にとり、塗布又は塗擦する。

## ■ 包装

60mL×10、500mL

# 手指消毒法



エタプラスゲルAを手のひらにとります。

500mL：ポンプひと押し分  
60mL：およそ500円玉大



初めに両手の指先（爪）にエタプラスゲルAをよくすり込み、手のひらになじませます。

※手のひらにのせるとゲルが液化するので、すばやく手になじませます。



次に手のひらによくすり込みます。



手の甲にもすり込みます。



指の間にもすり込みます。



親指にもすり込みます。



手首にも十分すり込みます。エタプラスゲルAが乾燥するまでよくすり込みます。

## エタプラス<sup>®</sup>ゲルAのINFORMATION

商品名	和名	エタプラス <sup>®</sup> ゲルA					
	洋名	ETHAPLUS <sup>®</sup> GEL A					
製造販売元	健栄製薬株式会社	承認番号	(16D)1626				
薬効分類	速乾性すり込み式手指消毒剤	承認年月	2004年8月				
区分	指定医薬部外品	販売開始年月	2005年1月				
組成性状	有効成分	エタノール (C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O) 76.9～81.4 vol%					
	添加物	ヒアルロン酸Na、グリセリン、トコフェロール酢酸エステル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン					
	性状	無色のわずかに混濁した粘性の液です。					
効能効果	手指の皮膚の洗浄・消毒						
使用上の注意	<b>してはいけないこと</b> (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は使用しないでください (1)患部が広範囲の人。 (2)深い傷やひどいやけどの人。 <b>相談すること</b> 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください		(1)医師の治療を受けている人。 (2)本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table>		関係部位	症状	皮膚
関係部位	症状						
皮膚	発疹・発赤、かゆみ						
用法用量	適量を手掌にとり、塗布又は塗擦してください。						
	<b>〈用法用量に関連する注意〉</b> (1)用法用量を厳守してください。 (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。 (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。		(4)外用にのみ使用してください。 (5)血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、使用してください。 (6)使用後は手を十分に乾燥させてください。(乾燥不十分のまま火気に手を近づけると引火するおそれがあります。)				
保管及び取扱い上の注意	<b>〈貯法〉</b> 気密容器・火気を避けて室温保存 <b>〈使用期限〉</b> 容器等に表示						
	(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。 (2)小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)		(4)火気に近づけないでください。 (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。 (6)薬剤が床や家具等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)				
包装	60mL×10、500mL						

[詳細は添付文書等をご参照ください。]

### 資料請求・お問い合わせ先

健栄製薬株式会社 学術情報部  
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号 電話番号 06 (6231) 5626 FAX番号 06 (6204) 0750