

## 医療機器・環境表面の消毒に…

外用殺菌消毒剤

サテニジン<sup>®</sup>液10

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩製剤

SATENIDIN<sup>®</sup> Solution 10

## 組成・性状

## 〈有効成分〉

100g中

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10g (10%)

## 〈添加剤〉

pH調節剤

## 〈性状〉

帯黄色の液で、わずかに特異なにおいがある。

本品 1g を水 10mL に溶かした液の pH は 7～9 である。

## 包装

500 mL、3 L、18 L

## 効能又は効果、用法及び用量

アルキルジアミノエチルグリシンとして下記の濃度になるように水で希釈して、次のように使用する。

効能又は効果	用法及び用量（本剤の希釈倍数）
手指・皮膚の消毒	0.05～0.2%溶液（50～200倍）で約5分間洗った後、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	0.1%溶液（100倍）で約5分間洗った後、0.2%溶液（50倍）を塗布する。
手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	0.01～0.05%溶液（200～1000倍）を用いる。
医療機器の消毒	0.05～0.2%溶液（50～200倍）に10～15分間浸漬する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液（20～50倍）を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.05～0.2%溶液（50～200倍）を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液（20～50倍）を用いる。

# DRUG INFORMATION

商品名	和名 洋名	サテニジン®液10 SATENIDIN® Solution 10	
承認番号	20600AMZ00067		
製造販売元	健栄製薬株式会社	薬価基準収載年月	1994年7月
日本標準商品分類番号	872619	販売開始年月	1994年9月
薬効分類	外用殺菌消毒剤	貯法	室温保存
規制区分	普通薬	有効期間	3年

## 3. 組成・性状

### 3.1 組成

有効成分	100g中 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 10g (10%)
添加剤	pH調節剤

### 3.2 製剤の性状

性状	帯黄色の液で、わずかに特異なおいがある。 本品1gを水10mLに溶かした液のpHは7～9である。
----	---

## 4. 効能又は効果

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒、医療機器の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒

## 6. 用法及び用量

アルキルジアミノエチルグリシンとして下記の濃度になるように水で希釈して、次のように使用する。

効能又は効果	用法及び用量
手指・皮膚の消毒	0.05～0.2%溶液で約5分間洗った後、滅菌ガーゼあるいは布片で清拭する。
手術部位（手術野）の皮膚の消毒	0.1%溶液で約5分間洗った後、0.2%溶液を塗布する。
手術部位（手術野）の粘膜の消毒、皮膚・粘膜の創傷部位の消毒	0.01～0.05%溶液を用いる。
医療機器の消毒	0.05～0.2%溶液に10～15分間浸漬する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液を用いる。
手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.05～0.2%溶液を布片で塗布・清拭するか、または噴霧する。なお、結核領域において使用する場合は、0.2～0.5%溶液を用いる。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、そう痒感等

## 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤で消毒したカテーテルで採取した尿は、スルホサリチル酸法による尿蛋白試験で偽陽性を示すことがある。

## 14. 適用上の注意

### 14.1 薬剤調製時の注意

- 14.1.1 本剤は必ず希釈し、濃度に注意して使用すること。  
14.1.2 本剤は下記の濃度（アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩として）に希釈し、水溶液として使用すること。

濃度	0.01%	0.05%	0.1%	0.2%	0.5%
希釈倍数	1,000倍	200倍	100倍	50倍	20倍

- 14.1.3 混濁している場合は、加温により溶解してから使用すること。  
[20.参照]  
14.1.4 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。  
14.1.5 深い創傷に使用する本剤の希釈水溶液は、調製後滅菌処理すること。

- 14.1.6 繊維、布（綿、ガーゼ、ウール、レーヨン等）は本剤の成分であるアルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩を吸着するので、これらを溶液に浸漬して用いる場合には、有効濃度以下とならないように注意すること。  
14.1.7 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合は、腐食を防止するために0.1～0.5%の割合で亜硝酸ナトリウムを溶解すること。なお、銅製の器具は亜硝酸ナトリウムを添加しても腐食を防止できないので長時間浸漬しないこと。  
14.1.8 次の医薬品等が混入すると、沈殿を生じるので注意すること。ヨードチンキ、硝酸銀、フェノール、過酸化水素、過マンガン酸カリウム等  
14.2 薬剤使用時の注意  
14.2.1 外用にのみ使用すること。  
14.2.2 原液又は濃厚液が眼に入らないように注意すること。入った場合には眼球、瞼のすみずみまで水がよく行きわたるように、清浄な水で15分以上眼を洗浄した後、直ちに適切な処置を行うこと。  
14.2.3 飲み込んだ場合は、水でよく口を洗い、無理に吐き出さず、水又は牛乳を飲ませ、直ちに適切な処置を行うこと。  
14.2.4 散布消毒の場合はマスクを着用するなど注意すること。  
14.2.5 濃厚液の使用により、皮膚・粘膜の刺激症状があらわれることがあるので、注意すること。  
14.2.6 粘膜、創傷面又は炎症部位に長期間又は広範囲に使用しないこと。  
14.2.7 血清、膿汁等の有機性物質は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している場合は、十分に洗い落としてから使用すること。  
14.2.8 石けん類は本剤の殺菌作用を減弱させるので、石けん分を洗い落としてから使用すること。  
14.2.9 皮膚消毒に使用する綿球、ガーゼ等は滅菌保存し、使用時に溶液に浸すこと。

## 18. 薬効薬理

### 18.1 作用機序

アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩は、陽イオン界面活性剤としての殺菌作用と、陰イオン界面活性剤としての洗浄作用を併せもつ両性界面活性剤である。

### 18.2 殺菌作用

本剤は使用濃度において、栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、結核菌、一部の真菌等には有効であるが、芽胞及び大部分のウイルスに対する効果は期待できない。


### 18.3 生物学的同等性試験

サテニジン液10とテゴー51消毒液10%の殺菌効果について、*in vitro*の最小発育阻止濃度（MIC）法、石炭酸係数法及びKelsey-Sykes法により比較した結果、両剤の生物学的同等性が確認された<sup>1)</sup>。

## 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩  
(Alkyldiaminoethylglycine Hydrochloride)  
化学名：N-[2-((2-[alkylamino]ethyl)amino)ethyl)glycine  
示性式：[RNHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NHCH<sub>2</sub>COOH]・HCl  
(Rは主としてC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>及びC<sub>14</sub>H<sub>29</sub>からなる。)

化学構造式：



R：主としてC<sub>12</sub>H<sub>25</sub>及びC<sub>14</sub>H<sub>29</sub>

## 20. 取扱い上の注意

本剤は色調に多少の濃度が生じることがあり、また、寒冷時にわずかに混濁することがあるが、殺菌効果に影響はない。[14.1.3参照]

## 22. 包装

500 mL（ポリエチレン容器）  
3 L（ポリエチレン容器）  
18 L（ポリエチレン容器）

## 23. 主要文献

1) 健栄製薬株式会社社内資料：サテニジン液10の生物学的同等性について

●電子添文の改訂に十分ご留意ください。  
●詳細は電子添文をご参照ください。  
電子添文：2023年4月改訂（第1版）

## 文献請求先及び問い合わせ先

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。  
健栄製薬株式会社 学術情報部  
〒541-0044 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06 (6231) 5822 FAX番号 06 (6204) 0750