

ヘパリン類似物質クリーム0.3%「ケンエー」

ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ケンエー」

の使用方法

このお薬は、皮膚にうるおいを与え、保湿します。
また、使用部位の血行を促進し、
血行障害に基づく痛みや腫れを
軽くします。

大人の人さし指（第2指）
の先端から第1関節まで
出した量（約0.5g）は、
およそ大人の手のひら
2つ分の面積にぬれます。



使い方、使用回数は医師の指示に従ってください。

- 適量を指や手のひらで患部に
のぼすようにしてぬってください。
- 朝起きた時や夜寝る前、
お風呂上り、水仕事や運動の後
などにご使用ください。



（裏面もご覧ください）

注 意

- きず口、皮膚がただれているところには使用しないでください。
- 目の中には使用しないでください。
目の周辺に使用する場合は、目の中に入らないように注意してください。万一、目の中に入った場合には、直ちにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談ください。
- このお薬を使用したあとに、皮膚が赤くなる、かゆくなる、ピリピリする、発しんがでるなどがあらわれた場合には使用を中止し、医師にご相談ください。
- このお薬は、キャップを閉めて室温で保管してください。（温度の高いところや直射日光の当たるところに保管するのは避けてください。）
- 小児の手の届かないところに保管してください。